

# Epilepszia

Az epilepszia a macskákban szerencsére ritkán fordul elő, de előfordulhat, hogy epilepsziás cicára kel vigyáznod, így fontos, hogy tisztában legyél az alapvető tudnivalókkal. Fontos elkülöníteni, hogy nem minden görcsös roham minősül epilepsziának, az epilepsziás betegek rohamai visszatérőek és folyamatos gyógyszeres kezelést igényelnek, itt a hangsúly a visszatérőn van, ugyanis egy önmagában előforduló görcsöt epileptiform görcsnek nevezünk. Ezt kiválthatják bizonyos toxinok, mérgezések, FIP-, FeLV-, FIV fertőzések és még ezer más dolog.

## **🐾 Amit epilepsziás görcsroham esetén tapasztalhatunk:**

- Viselkedés megváltozása, remegés, görcsök
- Furcsa testtartás
- Nyálzás
- Szokatlan vokalizáció
- Rángatózást
- Eszméletvesztés
- Vizelet-és/vagy bélsár ürítés

A görcsös roham általában 1-5 percig tart, de a roham után is látható lehet az állaton zavartság, szokatlan viselkedés.

## **🐾 FONTOS:**

- Ha rohamozni kezd az állat, biztosíts számára nyugodt, sötét, puha környezetet, próbáld elkerülni, hogy megsérüljön!
- Enni és inni nem szabad adni neki sem a görcs közben, sem közvetlenül utána mert könnyen félrenyelhet! (Akkor kaphat újra enni ha teljesen magánál van, és láthatóan tiszta a tudata.)
- Nagyon hasznos lehet videót készíteni a rohamról, de legalább feljegyezni, hogy pontosan mikor és mi történt, meddig tartott a görcs, milyen tüneteket tapasztaltunk, a későbbiekben segítséget nyújthat az állatorvos számára.
- Mindenképpen beszélj a gazdival, kérdezd meg fordult-e elő ilyen korábban, és beszéljétek meg, hogy vidd-e az állatot állatorvoshoz. Mi azt javasoljuk, a görcsroham után érdemes kivizsgáltatni az állatot, de minden esetben egyeztess a gazdival!

# Epilepszia

 Az epilepszia egy visszatérő, átmeneti agyi rendellenesség.

## A rohamnak 3 szakasza van:

- **Bevezető szakasz:** Általában szinte észrevétlenül rövid ideig tart. A tünetek változatosak lehetnek: nyugtalanság, félnkség, remegés, bevizelés, nyálzás, merev tekintet. Néha előfordulhat, hogy észlelhető előzmény nélkül kezdődik az epilepsziás görcs.
- **Görcsroham:** A végtagizmok és a fej izomgörcse, a macska az oldalán fekvé úszómozgásokat végez (lehet futómozgás-szerű rángatózás, ritmikus rángógörcs vagy merevgörcs), gyakran öntudatvesztéssel jár együtt.
- **Roham utáni állapot:** Néhány perctől akár több óráig is tarthat ez a szakasz, jellemző a mozgáskoordináció zavara, viselkedésváltozás (időnként akár agresszió is!), zavartság és átmeneti vakság is előfordulhat. A görcsroham után a cica percek alatt tünetmentessé válhat, de hosszabb ideig is zavart állapotban maradhat. Veszélyes állapot, maradandó agykárosodást, halált is okozhat.

**A roham időtartama általában 1-5 perc.** A macska az oldalán fekszik, fejét hátra feszíti, akár a végtagok futómozgásszerű rángásai, görcsei láthatók. Az esetek nagy részében a beteg tudatát elveszti, szólításra nem reagál. Fontos, hogy a roham alatt és után tartsuk az állatot meleg, csendes, puha helyen. Ne kapcsoljunk villanyt, biztosítsunk csendes környezetet, és ha vannak más állatok is, őket különítsük el. Ne hagyjuk kemény padlón rohamozni a cicát, mert megsérülhet a túl erős rángások közepette! Beszéljünk a tulajdonossal, ha szükséges, a kezelőállatorvossal is.

Ha epilepsziás állatra vigyázol, a görcs kialakulásakor szükség lehet diazepam hatóanyagú végbélkúp beadására. Minden esetben a gazdi utasításait kell követned, még az ismerkedés során kérdezz ki minden apró részletet.

