

Idegen testek lenyelése

A cicák is nagyon kíváncsiak, és előszeretettel kóstolnak meg szallagokat, hajgumikat, gyerekjátékokat, akkor is, ha az nem ehető. Sajnos **gyakran találkozunk az állatorvosi rendelőkben a lenyelt tárgyak okozta bélelzáródással.** Ez legtöbb esetben csak műtéti, vagy endoszkópos úton orvosolható. Bizonyos esetekben a hánytatás is megoldás lehet, azonban ez függ a lenyelt tárgytól, és az eltelt időtől is. **Ha nem kerül a cica időben állatorvoshoz, hashártyagyulladás, majd halál is bekövetkezhet.**

Gyakori lenyelt idegen testek:

- 🐾 hajgumi
- 🐾 fonál
- 🐾 szalag
- 🐾 zokni
- 🐾 műbél
- 🐾 barackmag
- 🐾 csomagolóanyagok
- 🐾 gyerekjátékok
- 🐾 csont, vagy csont darabok

Javasoljuk, hogy amennyire csak teheted, ezektől tartsd távol a rád bízott cicát! Csak olyan játékot adj neki, amit biztosan nem tud lenyelni!



🐾 Milyen tünetekkel járhat az idegentest lenyelése?

- Bágyadtság, elesettség, étvágytalanság
- Gyakori hányás
- Bélsárürítés hiánya vagy hasmenés
- Hasi fájdalom jelei, hasi érzékenység
- Nyálzás
- Púposítás a hasi fájdalom miatt
- Viselkedésbeli változások: harapás vagy morgás, ha felemeljük, vagy a hasához érünk

🐾 Hogyan lehet diagnosztizálni a gyomor-bélrendszerbe került idegen testeket?

Ha felmerül az idegen test gyanúja, akkor röntgen- és/vagy ultrahang vizsgálatra van szükség. Amennyiben röntgennel nem kimutatható az idegen test, akkor kontrasztos röntgen készítésével lehet kimutatni az elzáródást, vagy a lenyelt tárgyat.

🐾 Hogy lehet kezelni a bélrendszerbe jutott idegen testek okozta kórképeket?

Legtöbb esetben műtéti, vagy endoszkópos úton távolíthatóak el az idegentestek. Ilyenkor is versenyt futunk az idővel, minél hosszabb idő után kerül sor a beavatkozásra, annál nagyobb a műtéti kockázat! Az idegen testek miatt kialakult részleges vagy teljes elzáródás rontja vagy megszüntetheti a szervek vérellátását. Így akár már néhány óra alatt elhalhat a nyelőcső, gyomor vagy bélrendszer fala, súlyos esetben át is szakadhat, és akár az állat életét is veszélyeztető állapot jöhet létre. Szövődményként hashártyagyulladás, az ionháztartás felborulása, septicémia, septicus sokk, veseelégtelenség is kialakulhat.

🐾 Hogyan tudod megelőzni az idegentest okozta bélelzáródást?

Érdemes naponta többször mindent felszedni a földről, amit lenyelhet a cica. Ha látjuk, hogy lenyel valamit macska, akkor a legjobb, ha azonnal orvoshoz fordulunk. Minél előbb megyünk állatorvoshoz, annál nagyobb az esélye, hogy a probléma még orvosolható és nem alakul ki komolyabb szövődmény.

Egyéb balesetek

Közúti baleset:

Gázolás során előfordulhat, hogy nem történik a cicán kívülről látható változás, azonban ha ilyen baleset történik, mindenképp vigyük a macskát állatorvoshoz ellenőrzésre, mert lehet belső vérzése, rekeszizom sérve, vagy húgyhólyag repedése is akár.

Sok esetben a gázolások eredménye egy végtagtörés vagy medencetörés. Ha erősen vérzik, szükséges lehet szorítókötés felhelyezésére, amíg elérünk az állatorvoshoz!

Égési sérülés:

Ha még friss a sérülés, még nem látszanak a különböző fokú égés tünetei:

1. Az égett területet hideg csapvízzel vagy törülközőbe csavart jégzsellel/ jéggel /fagyasztott zöldséggel hűtjük 10-15 percig.

Fontos, hogy közvetlenül NE érintsünk a sebhez semmilyen hűtésre szolgáló tárgyat, csakis valamilyen textilbe tekerve!

2. Hideg csapvízzel nedvesítsünk be néhány gézlapot, majd körkörösén rögzítsük steril rugalmas pólyával.

3. Azonnal juttassuk el a cicát állatorvoshoz! Ő majd megállapítja az égési sérülés súlyossági fokát, illetve elvégzi a további kezelést.

4. Csak akkor adhat sz inni a cicának, ha nincs sokkos állapotban, és elfogadja a vizet.



Ha az égés régebben történt, már csak az I., II., vagy III. fokú égés kialakult tüneteit látod:

Az ilyen jellegű égési sérüléseket nem kell hűteni.

1. Kis felületű sérülés esetén néhány darab steril, hideg csapvízzel benedvesített gézlapot helyezünk a sebre, majd steril rugalmas pólyával körkörösén rögzítsük úgy, hogy ne legyen túl szoros, fájdalmat keltő, de ne is mozduljon el. A seb bekötése után azonnal vigyünk a cicát az orvoshoz!

2. Nagyobb felület esetén is fontos, hogy meggátoljuk a seb kiszáradását. Egy nedvesített tiszta törülköző, ruhadarab vagy lepedő megfelelő lehet erre a célra.

Feltételezhetően III. fokú égési sérülés történt, ha nagy hámphányos területeket, fekete, elszenesedett vagy fehér, hólyagosan felpuffadt bőrfelületet látunk.

