

Cicák védőoltásai

Mik azok az oltások és miért szükséges oltatnom a cicámat?

A védőoltások olyan immunbiológiai készítmények, amelyek az adott kórokozó legyengített változatát tartalmazzák. Beadást követően kis idő elteltével védettséget alakítanak ki az adott betegséggel szemben.

A legtöbb vakcinát **többször kell beadni, hogy biztos védettség alakuljon ki.** Ahhoz pedig, hogy a védettség egész életen át tartson, évente szükséges beadni az emlékeztető oltásokat.

Általánosan a cicák eltérő oltási protokolban részesülnek attól függően, hogy lakásban tartottak, vagy kijárósak.

Ajánlott alap oltási sor cicáknak:

Benti kiscicák: Kis kombinált oltásban részesülnek 8-9 hetesen, majd 11-12 hetesen.

Kijárós kiscicák: Nagy kombinált oltásban részesülnek 8-9 hetesen, majd 11-12 hetesen, emellé egy harmadik, veszettség elleni vakcinában is részesülnek 14 hetesen.

Ezt követően minden cica évente kombinált oltást kap, a kijárós cicák pedig kombinált + veszettség elleni vakcinát.



Cicák védőoltásai

Te is megfeledkezel az ismétlőoltások beadatásáról? Nehéz fejben tartani, mikor esedékes cicád következő vakcinája?

Oltás emlékeztetőnkkel ebben is segítünk!

Regisztrálj a www.petwisecare.com-on majd készítsd el cicád profilját és máris beállíthatod az oltás emlékeztetőt! Vezesd fel az utolsó oltás időpontját és többé nem kell aggódnod az elfelejtett oltások miatt!

Segítünk, hogy cicád időben megkapja az oltásait!



Készítsd el kedvenced profilját



Vezesd fel az utolsó oltás időpontját



Többé nem kell aggódnod az elfelejtett oltások miatt!



Oltási reakció

Az esetek többségében a **legtöbb macskánál semmilyen komolyabb mellékhatással nem járnak** az oltások, de fontos, hogy esetleges kialakulásuk esetén tudjuk, mit kell tennünk! Összeszedtem neked a legfontosabb tudnivalókat az oltási reakciókról:



A **természetes immunreakció** részeként gyakori, hogy a védőoltást követő pár óra múlva, az alábbi felsorolt tünetek közül néhányat vagy mindegyiket tapasztalod a cicádon - ez teljesen normális:

- rossz közérzet
- helyi duzzanat az védőoltás helyén
- hőemelkedés, enyhe láz
- étvágytalanság és bágyadtság

Ha ezek a mellékhatások egy vagy két napnál tovább tartanak, esetleg jelentős közérzet romlást okoznak a cicádnak, konzultálj állatorvosoddal!

Nagyon ritka, de kritikus beszámítás alá eső mellékhatás az **allergiás reakció**, amely percek alatt vagy néhány órán belül alakul ki a védőoltás beadása után. Ezek a reakciók **életveszélyesek lehetnek és sürgősségi ellátást igényelnek!** Azonnal keresd fel állatorvosod, ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalod:

- **folyamatos hányás vagy hasmenés**
- **viszkető, egyenetlen felületű bőr/csalánkiütés/**
- **az orr, nyak, szemkörnyék, pofa duzzanata, ödémája**
- **súlyos köhögés vagy nehezített légzés**
- **ájulás, összecsuplás**

Általánosságban elmondható az, hogy az oltás után minél később jelentkeznek a tünetek, annál enyhébb beszámítás alá esnek.

A védőoltás után, a **bőr alatt egy apró kemény csomó** alakulhat ki. Ennek a csomónak néhány hét alatt el kell tűnnie. Ha a csomó az oltás után 3 héttel is megvan, esetleg növekszik, keresd fel állatorvosod.

Fontos!

Mindig tájékoztasd állatorvosod arról, ha korábban már volt valamilyen tünet a fentiek közül védőoltást vagy gyógyszer beadását követően! Ha kétségeid vannak arról, hogy előfordult-e már allergiás reakció, akkor a védőoltás beadása után 1/2 – 1 órát maradjatok még a rendelőben. Érdemes ilyen esetben az oltás időpontját a délelőtti órákra időzíteni, hogy ha kialakulnak tünetek, ne az éjjeli ügyeletre kelljen menni.



Mi ellen védenek az oltások?

Kombinált oltás: 4 fertőző betegség: a herpeszvírusos rhinotracheitis, a calicivírusos nátha, a parvovírus okozta pánleukopénia és a chlamydia ellen ad védelmet.

A nagy kombinált oltás a **macskaleukózis** vírus ellen is véd. Ez az egyik leggyakoribb fertőző macskabetegség, amely oltással megelőzhető, de ha az oltatlan állat elkapja, gyógyíthatatlan.

Összefoglalva a cicák oltási protokollja:

Lakásban tartott cicáknál

8-9 hetes korban: kis kombinált oltás
(fertőző orr- és légcsőgyulladás, fertőző
gyomor-és bélgyulladás, calicivírus
okozta nátha, chlamidiosis elleni
védőoltás egyben)

11-12 hetes korban: ismételt kis
kombinált oltás

Bent tartott cicáknak nem szükséges
veszettség elleni oltást kapniuk

Kijárós cicáknál:

8-9 hetes korban: nagy kombinált oltás
(fertőző orr- és légcsőgyulladás, fertőző
gyomor-és bélgyulladás, calicivírus okozta
nátha, chlamidiosis, macskaleucosis elleni
védőoltás egyben)

11-12 hetes korban: ismételt nagy
kombinált oltás

13-14 hetes korban: veszettség elleni oltás
(külföldre utazáshoz is szükséges)

**Ezt követően évente szükséges ismételni
a kombinált-, és veszettség oltást is a
védettség megőrzése érdekében!**

Leukózis teszt??

A leukózis oltás előtt fontos meggyőződnöd róla, hogy kedvenced nem fertőződött e már a vírussal, ugyanis ha fertőzött, akkor felesleges lenne beoltani. Ehhez egy gyorsesztes szűrővizsgálatot végez el állatorvosod, melynek eredménye 10 percen belül megvan, és csak pár csepp vérre lesz szükség a cicától.

A gyorsesztesztel egyszerre tudjuk szűrni a **két leggyakoribb fertőző macskabetegséget**, az előbbieken említett **leukózi**szt (FeLV) és a **macska AIDS-t** (FIV).

Mindkét betegség elsősorban az immunrendszert támadja meg, így azért is fontos a teszt, hogy felmérjük cicád immunstátuszát. Ha valamelyik tesztje pozitív lesz, akkor orvosod megkezdi az immunerősítő kezelést.

Oltások kijárós macskáknak

Kijárós macskáknál a kockázati tényezőket mérlegelve már mindenképpen ajánlott a kombinált oltás leukózis ellen is védő változata, aminél ebben az esetben is évenkénti ismétlésre van szükség.

