

Sebkezelés - fedőkötés

A sebkezelést mindig tisztítással kezdjük: tiszta vízzel, majd hígított betadine oldattal tisztítsuk meg a sebet. Ha nagyobb a seb, vagy kétségeink vannak, forduljunk állatorvoshoz! A sebek 24 órán belül varrhatók össze, tehát ennél többet ne késlekedjünk, és ha szükséges, szállítsuk állatorvoshoz a cicát.

Nagyon fontos, hogy megakadályozzuk a seb nyalogatását, hiszen ez nagyon hátráltatja, megnyújtja a sebgyógyulást. Egyrészt mechanikai izgalom éri a sebet, másrészt a nyálukkal a macskák rengeteg baktériumot visznek be a sebbe. Az állatorvosnál vásárolhatunk védőgallért erre a célra, azonban amíg eljutunk az állatorvoshoz, nekünk kell ügyelni a seb nyalogatásának megakadályozására! Ha van otthon korábban megtartott gallér, helyezzük fel a cica nyakára, hogy ne piszkálja a sebet, amíg eljut az állatorvoshoz.

Hajszáleres vérzés

Kis mennyiségű, szivárgó, piros vér ürül a sebből. Enyhe, felületi horzsolás, vágás okozhatja.

A teendők:

1.Rögzítsd a macskát: tanácsos törölközőbe csavarni, majd fektesd olyan testhelyzetbe, hogy könnyen hozzáférj a sérüléséhez.

2.Vízzel mosd le a seb környékét, tisztítsd meg, a seb közepétől kifelé haladva, úgy, hogy a seb fölötti területre ne kerüljön folyó víz, mert úgy csak belemosnánk a sebbe a szennyeződések!

3.Fertőtlenítsd le a sebet hígított Betadine oldattal!

4.Helyezz steril fedőkötést a sebre: néhány darab steril gézlapot teszünk a sebre, majd steril mullpólyával körbetekerjük a lábvégtől a test felé haladva egymást fedő pólyamenetekkel. Kívülről ragasztószalaggal (leukoplast), illetve rugalmas kötszerrel rögzítjük. Fontos, hogy ne legyen túl szoros a kötés, mert ezzel keringési rendellenességet okozhatunk, főleg a lábvégen. Ha a másik oldalon aláfér az ujjbegyed, akkor megfelelő.

Fedőkötés készítése

1.

Steril gézlap a sebre



2.

Körbetekerés mull pólyával



3.

Rögzítés rugalmas pólyával



Sebkezelés - nyomókötés

Közepes erekből történő vérzés

Nagyobb mennyiségű vér folyik vagy ömlik a sebből. Szúrt, harapott, vágott seb esetén számíthatunk erősebb vérzésre. **Minden bőrön áthatoló trauma állatorvosi ellátást igényel!** Szúrt sebet okozhat egy kaktusz is, azok környezetében ne játssz a macskával, ugyanis heves játék közben akár fel is nyársalódhat a kaktuszon! Harapott seb esetében, akkor is állatorvosi ellátás szükséges, ha egyáltalán nem vérzik kifelé, ugyanis okozhat belső vérzést vagy légmellet is, ami életveszélyes állapot. Vágott seb esetében mindig szükséges fedőkötést felhelyezni, amíg állatorvoshoz érsz vele!

Enyhe, szivárgó vérzés esetén

Ugyanaz a feladatod, mint hajszáleres vérzés esetén: a sebtisztítás után helyezz fedőkötést a sebre!

Nagyfokú, ömlő vérzés

Ilyenkor a vérzés csillapítása az elsődleges feladat a seb ellátása előtt, **így egy szorító kötés** felhelyezésével kezdünk: például egy gézcsíkkal, vagy bármilyen anyaggal – amivel el tudod szorítani a végtagot **a seb felett**. Ezt szorosan, csomóra kötjük. Később nyomókötés felhelyezése után a szorítókötést 15 percenként lazítsuk meg 15-20 másodpercre, hogy ne szorítsuk el a teljes vérrellátást!

A szorító kötés felhelyezése után tisztítsd meg, és fertőtlenítsd a seb környékét, a seb közepétől kifelé haladva. **Alkalmazz steril nyomókötést:** a sebre steril gézlapokat helyezünk, erősen rányomjuk, erre pedig egy steril pólyatekercset vagy gézhengert nyomunk. Ez minél vastagabb, annál nagyobb a nyomó hatása. Körkörösén felhelyezett pólyamenetekkel rögzítjük a végtag körbetekerésével, ügyelve, hogy végig feszes és szoros maradjon a pólya. Ha átvérzik, nem vesszük le, hanem újabb réteget csavarunk köré. A kötés szorossága akkor megfelelő, ha a másik oldalon aláfér az ujjbegyed.

Azonnal vigyük állatorvoshoz a nyomókötés felhelyezése után, mert a nagy mennyiségű vérvesztés életveszélyes lehet! Erős vérzésnél ellenőrizd a macska szájnyálkahártyáját, ha kezd fakulni, az súlyos vérvesztés jele! Ebben az esetben a sokk kialakulása fenyeget, minél hamarabb vidd állatorvoshoz!

Artétiás vérzés

A sebből lüktetve élénkpiros vér spriccel.

Azonnal **nyomókötést** helyezünk a sebre: A sebre steril gézlapokat helyezünk, erősen rányomjuk, erre pedig egy steril pólyatekercset vagy gézhengert nyomunk. Ez minél vastagabb, annál nagyobb a nyomó hatása. Körkörösén felhelyezett pólyamenetekkel rögzítjük a végtag körbetekerésével, ügyelve, hogy végig feszes és szoros maradjon a pólya. Ha átvérzik, nem vesszük le, hanem újabb réteget csavarunk köré. A kötés szorossága akkor megfelelő, ha a másik oldalon aláfér az ujjbegyed.

Vénás vérzés

Enyhe szivárgó vérzésnél **fedőkötés** elegendő.

Ha nagy mennyiségű vér ömlik a sebből, **szorító**, majd **nyomó** kötést helyezünk fel. A szorító kötést eltávolíthatjuk a nyomókötés felhelyezése után, de minden esetben lazítsuk meg pár másodpercre, hogy ne szorítsuk el a vérkeringést!

TILOS szorító- és nyomó kötést felhelyezni nyaki ütőeres és vénás vérzés esetén! Ilyen esetben kezünkkel steril pólyatekercset szorítsunk a vérzés helyére, amíg orvoshoz érünk vele!

Harapott és szúrt seb esetén haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz!

Ha idegen test szúródott a sebbe – (akár egy faág), azt soha ne távolítsuk el, vigyünk azonnal állatorvoshoz a cicát!



Nyomókötés készítése

1.

Steril gézlap a sebre



2.

Körbetekerés mull pólyával



3.

Pólyatekercset nyomunk a sebbe



4.

Rögzítés rugalmas pólyával

Szorítókötés készítése

1.

Végtag elszorítása a seb
fölött



2.

Steril mulllap a sebre



3.

Nyomókötés
felhelyezése



4.

Rögzítés rugalmas
pólyával



5.

Kész kötés