Sebkezelés - fedőkötés

A sebkezelést mindig tisztítással kezdjük: tiszta vízzel, majd hígított betadine oldattal tisztítsuk meg a sebet. Ha nagyobb a seb, vagy kétségeink vannak, forduljunk állatorvoshoz! A sebek 24 órán belül varrhatók össze, tehát ennél többet ne késlekedjünk, szállítsuk állatorvoshoz a cicát.

Nagyon fontos, hogy megakadályozzuk a seb nyalogatását, hiszen ez nagyon hátráltatja, megnyújtja a sebgyógyulást. Egyrészt mechanikai izgalom éri a sebet, másrészt a nyálukkal a macskák rengeteg baktériumot visznek be a sebbe. Az állatorvosnál vásárolhatunk védőgallért erre a célra, azonban amíg eljutunk az állatorvoshoz, nekünk kell ügyelni a seb nyalogatásának megakadályozására! Ha van otthon korábbról megtartott gallér, helyezzük fel a cica nyakára, hogy ne piszkálja a sebet, amíg eljut az állatorvoshoz.

Hajszáleres vérzés

Kis mennyiségű, szivárgó, piros vér ürül a sebből. Enyhe, felületi horzsolás, vágás okozhatja.

A teendőnk:

1.Rögzítsd a macskát: tanácsos törölközőbe csavarni, majd fektesd olyan testhelyzetbe, hogy könnyen hozzáférj a sérüléséhez.

2.Vízzel mosd le a seb környékét, tisztítsd meg, a seb közepétől kifelé haladva, úgy, hogy a seb fölötti területre ne kerüljön folyó víz, mert úgy csak belemosnánk a sebbe a szennyeződéseket!

3.Fertőtlenítsd le a sebet higított Betadine oldattal!

4.Helyezz steril fedőkötést a sebre: néhány darab steril gézlapot teszünk a sebre, majd steril mullpólyával körbetekerjük a lábvégtől a test felé haladva egymást fedő pólyamenetekkel. Kívülről ragasztószalaggal (leukoplast), illetve rugalmas kötszerrel rögzítjük. Fontos, hogy ne legyen túl szoros a kötés, mert ezzel keringési rendellenességet okozhatunk, főleg a lábvégen. Ha a másik oldalon aláfér az ujjbegyed, akkor megfelelő.

PETWISECARE

Fedőkötés készítése

1. Steril gézlap a sebre



2. Körbetekerés mull pólyával

3. Rögzítés rugalmas pólyával

Sebkezelés - nyomókötés

Közepes erekből történő vérzés

Nagyobb mennyiségű vér folyik vagy ömlik a sebből. Szúrt, harapott, vágott seb esetén számíthatunk erősebb vérzésre. **Minden bőrön áthatoló trauma állatorvosi ellátást igényel!** **Szúrt sebet** okozhat egy kaktusz is, azok környezetében ne játssz a macskával, ugyanis heves játék közben akár fel is nyársalódhat a kaktuszon! **Harapott seb esetében**, akkor is állatorvosi ellátás szükséges, ha egyáltalán nem vérzik kifelé, ugyanis okozhat belső vérzést vagy légmellet is, ami életveszélyes állapot. **Vágott seb** esetében mindig szükséges fedőkötést felhelyezni, amíg állatorvoshoz érsz vele!

Enyhe, szivárgó vérzés esetén

Ugyanaz a feladatod, mint hajszáleres vérzés esetén: a sebtisztítás után helyezz fedőkötést a sebre!

Nagyfokú, ömlő vérzés

Ilyenkor a vérzés csillapítása az elsődleges feladat a seb ellátása előtt, **így egy szorító kötés** felhelyezésével kezdünk: például egy gézcsíkkal, vagy bármilyen anyaggal – amivel el tudod szorítani a végtagot **a seb felett**. Ezt szorosan, csomóra kötjük. Később nyomókötés felhelyezése után a szorítókötést 15 percenként lazítsuk meg 15-20 másodpercre, hogy ne szorítsuk el a teljes vérellátást!

A szorító kötés felhelyezése után tisztítsd meg, és fertőtlenítsd a seb környékét, a seb közepétől kifelé haladva. **Alkalmazz steril nyomókötést**: a sebre steril gézlapokat helyezünk, erősen rányomjuk, erre pedig egy steril pólyatekercset vagy gézhengert nyomunk. Ez minél vastagabb, annál nagyobb a nyomó hatása. Körkörösen felhelyezett pólyamenetekkel rögzítjük a végtag körbetekerésével, ügyelve, hogy végig feszes és szoros maradjon a pólya. Ha átvérzik, nem vesszük le, hanem újabb réteget csavarunk köré. A kötés szorossága akkor megfelelő, ha a másik oldalon aláfér az ujjbegyed.

Azonnal vigyük állatorvoshoz a nyomókötés felhelyezése után, mert a nagy mennyiségű vérvesztés életveszélyes lehet! Erős vérzésnél ellenőrizd a macska szájnyálkahártyáját, ha kezd fakulni, az súlyos vérvesztés jele! Ebben az esetben a sokk kialakulása fenyeget, minél hamarabb vidd állatorvoshoz!

Artétiás vérzés

A sebből lüktetve élénkpiros vér spriccel.
Azonnal **nyomókötést** helyezünk a sebre: A sebre steril gézlapokat helyezünk, erősen rányomjuk, erre pedig egy steril pólyatekercset vagy gézhengert nyomunk. Ez minél vastagabb, annál nagyobb a nyomó hatása. Körkörösen felhelyezett pólyamenetekkel rögzítjük a végtag körbetekerésével, ügyelve, hogy végig feszes és szoros maradjon a pólya. Ha átvérzik, nem vesszük le, hanem újabb réteget csavarunk köré. A kötés szorossága akkor megfelelő, ha a másik oldalon aláfér az ujjbegyed.

Vénás vérzés

Enyhe szivárgó vérzésnél **fedőkötés** elegendő.
Ha nagy mennyiségű vér ömlik a sebből, **szorító**, majd **nyomó** kötést helyezünk fel. A szorító kötést eltávolíthatjuk a nyomókötés felhelyezése után, de minden esetben lazítsuk meg pár másodpercre, hogy ne szorítsuk el a vérkeringést!

TILOS szorító- és nyomó kötést felhelyezni nyaki ütőeres és vénás vérzés esetén! Ilyen esetben kezünkkel steril pólyatekercset szorítsunk a vérzés helyére, amíg orvoshoz érünk vele!

Harapott és szúrt seb esetén haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz!

Ha idegen test szúródott a sebbe – (akár egy faág), azt soha ne távolítsuk el, vigyük azonnal állatorvoshoz a cicát!

PETWISECARE

Nyomókötés készítése

1. Steril gézlap a sebre

2. Körbetekerés mull pólyával



3. Pólyatekercset nyomunk a sebbe

4. Rögzítés rugalmas pólyával

PETWISECARE

Szorítókötés készítése

1.

Végtag elszorítása a seb fölött



2.

Steril mulllap a sebre

3.

Nyomókötés felhelyezése

4.

Rögzítés rugalmas pólyával

5.

Kész kötés