

Egyéb egészségügyi esetek ellátása

Kullancs biztonságos eltávolítása:

Egy csipesz segítségével fogjuk meg a kullancsot olyan közel a cica bőréhez, amilyen közel csak tudjuk! Vigyázzunk, hogy a kullancsot ne nyomjuk össze a csipesszel, próbáljuk csak a feji részét megfogni! Majd miközben húzzuk, óvatos csavaró mozdulatot végezzünk. A kullancs eltávolítása után a helyét Betadine oldattal kenjük be. Jelezzük a gazdinak, és javasoljuk a kullancs-bolha elleni védelem megújítását.

Csípések

Tünetek súlyosabb esetben anafilaxiás sokként is jelentkezhetnek!

Ha a macska allergiás a méh csípésére, akkor súlyos tünetek, úgynevezett anafilaxiás sokk alakulhat ki.

Anafilaxiás sokk tünetei:

-  nehezített, szapora légzés
-  szapora szívverés
-  bedagad a nyelve, a torka, nem kap levegőt, nem tud nyelni, fullad (gégeödéma miatt)
-  légzéskor szokatlan, szörcsögő hangot ad ki (tüdőödéma)
-  hány, hasmenése van
-  lázas
-  izomfájdalma, izomgörcse van
-  nehezen tud mozogni
-  sápadt az ínye

Ha a fentiek közül bármelyik tünetet tapasztalod, sürgősen szakszerű ellátásra van szükség, tehát azonnal irány az állatorvos! **Ne késlekedj, minden perc számít!** Különösen veszélyes, ha például a méh vagy darázs szúrja meg véreren vagy a nyak, száj, nyelőcső területén.



Vércukorszint leesése:

Cukorbeteg cicában inzulin túladagolás miatt:

Akkor fordulhat elő, ha nem eszik, vagy hány inzulinadagolás mellett, esetleg túladagoltuk az előírt inzulin adagját.

Fontos, hogy az inzulin beadás előtt etessük meg a macskát!

Ha hányt, vagy nem eszi meg az ételét, csak az inzulin adagja felét adjuk be!

Kenjünk mézet a szájnyálkahártyára!

Ha többször is előfordul hányás vagy étvágytalanság, konzultálj állatorvosoddal, vagy kérdezd online állatorvosainkat itt:

<https://gazdisuli.com/online-allatorvos/>

