

Kutya kötelesség

Nézzük, kutya gazdiként mik a kötelességeid, amiket be kell tartanod kutyázás közben:

-  **Veszetség oltás, és féreghajtó tabletta beadása 1 évente.**
-  A kutya **microchippel** való megjelölése legkésőbb 4 hónapos koráig.
-  **Pórázon** tartani kutyusodat **közterületen**.
-  **Szájkosarat tenni rá, ha tömegközlekedési eszközön utaztok** - kivéve: vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő kutya!
-  Közterületen biztosítanod kell, hogy kutyusod **sem másik állatot, sem embert ne veszélyeztethessen** harapásával.
-  **Összeszedni kutyusod ürülékét** - a kutyakaki állatokra és emberekre egyaránt veszélyes betegségeket is terjeszthet.
Figyelem! Nézd is meg! A kutya egészségi állapotára utal az ürülék színe, állaga, gyakorisága. Ha bármi szokatlant tapasztalsz, mielőbb keresd fel állatorvosodat!
 Kutyasétáltatás közben kötelező magadnál tartanod a kutyus oltási könyvét, vagy útlevelét, hogy igazolni tudd az érvényes veszetség oltását - amennyiben erre a hatóság felszólít
-  Részt venni a területi **ebösszeírás**on, és leadni az adatokat abban az évben, amikor az Önkormányzat erre felkéri lakóit, akkor is, ha már regisztráltad kutyusodat egy előző alkalommal.
 A háromévente aktuális ebösszeírás lényege, hogy az országban érvényes ebnyilvántartást naprakészen tartsa. Az összeírás keretein belül frissítik a tulajdonos és a kutya adatait, a további információk között pedig szerepel többek között a beültetett mikrochip száma, a veszetség elleni oltás időpontja és a kezelő állatorvos adatai is.
-  Soha ne engedjük kutyánkat egyedül, felügyelet nélkül az utcára. **Az önsétáltató kutyák önmagukra és környezetükre is veszélyt jelentenek.** Ez hatósági eljárás kockázatát is jelenti, hiszen állattartási törvényben is kimondott kötelessége a gazdának gondoskodni arról, hogy ez ne történjen meg még véletlenül sem.



Gyakori betegségek

Kutya parvovírus



A vírus fő forrása a **fertőzött kutyák ürüléke**. A vírus már a tünetek megjelenése előtt is ürülhet, és a **vírusürítés a tünetek elmúltával akár hetekig is eltarthat**. Elsődlegesen a **bélnyálkahártya sejtjeit támadja meg**, de egyes esetekben **szívizom károsodást is okozhat**.

Tünetek:

- 🐾 hányás
- 🐾 súlyos, akár véres hasmenés
- 🐾 láz
- 🐾 lesoványodás
- 🐾 kiszáradás

A vírus a **környezetben is életben marad**, bármilyen a vírussal szennyezett tárggyal -pl. cipő, ruházat - átvihető a fertőzés. **Ezért fontos, hogy a parvo ellen megfelelő védettséggel még nem rendelkező kölyökkutyánkat ne vigyük olyan helyre, ahol más kutyákkal is találkozhat (pl. kutyafuttató, kutyaiskola), és ne hagyjuk neki, hogy utcai cipőnket nyalogassa!**

A parvo leggyakrabban az **oltatlan, egy évnél fiatalabb kutyáknál** fordul elő, de minden életkorú kutyát érinthet.

Mivel a vírus felnőtt kutyákat is megbetegíthet, ezért nekik is ajánlott évente beadatni az emlékeztető oltást. (A kombinált oltás tartalmazza.)

Szopornyica / vírusos tüdőgyulladás



A szopornyica **cseppfertőzéssel terjed**, általában az alábbi testnedvek továbbítják egyik kutyáról a másikra: **vizelet, széklet, szem- és orrváladék**.

Elég, ha a kutyusunk megszaglássza vagy megnyalja egy fertőzött kutya vizeletét, és máris elkaphatja a szopornyicát. Az évente adandó kombinált oltással tudunk védekezni ellene.

Tünetek:

Mindig magas lázzal kezdődik, majd három, jól elkülönülő szakasza alakulhat ki. A kutya áteshet az összes szakaszon, de az is lehet, hogy csak egyetlen jelentkezik a három közül:

1. Kezdeti szakasz

Általában egy hétig tart, legjellemzőbb tünete a magas, **akár 41 fokal**. A betegségre ebben a fázisban az úgynevezett **kettős lázcsipke** jellemző, ami azt jelenti, hogy pár nap lázas állapot után 2-3 lázmentes nap következik, majd az állat újból belázasodik.

Megjelenhetnek a kutya combjainak belső részén sötétpiros-vörös árnyalatú kiütések, melyek felhólyagosodhatnak és belőlük gennyes váladék is szivároghat. E mellett a bágyadság, levertség, étvágytalanság is kísérheti ebben a szakaszban.

2. Hurutos szakasz

Ekkorra az állat szervezete legyengült, így további kórokozók is megfertőzhetik – szövődményeket okozva.

Az alábbi tünetek jellemzik:

-  Torokgyulladás, mandulagyulladás, tüdőgyulladás is jelentkezhet.
-  Szem váladékozás – amely a kötőhártya gyulladás tünete.
-  Tüsszögés, köhögés
-  Hányás, hasmenés is jelentkezhet a gyomor- bélgyulladás miatt
-  A kutya bőre a talppárnákon, és orrán megvastagodhat
-  A fogakon barnás elszíneződés jelenik meg – ez sajnos általában egy életre megmarad.

3. Idegrendszeri szakasz

A betegség tovább súlyosbodik. Izgatottság, ferde fejtartás, remegés és izomrángás jellemzi.

Tünetek: ferde fejtartás, körbejárás, fényérzékenység, érintéssel szembeni túlzott érzékenység, remegés, fogcsattogtatás, görcsök, bénulás.

Sajnos ezen tünetek megjelenése után a beteg állatok jelentős része elpusztul.

A gyógykezelés csak a korai felismerés és az időben elkezdett szakszerű terápia esetén lehet sikeres, így ha a fent említett tünetek valamelyikét észleljük kutyánkon, azonnal forduljunk állatorvoshoz!