

Gyakori betegségek

Kutya parvovírus



A vírus fő forrása a **fertőzött kutyák ürüléke**. A vírus már a tünetek megjelenése előtt is ürülhet, és a **vírusürítés a tünetek elmúltával akár hetekig is eltarthat**. Elsődlegesen a **bélnyálkahártya sejtjeit támadja meg**, de egyes esetekben **szívizom károsodást is okozhat**.

Tünetek:

- 🐾 hányás
- 🐾 súlyos, akár véres hasmenés
- 🐾 láz
- 🐾 lesoványodás
- 🐾 kiszáradás

A vírus a **környezetben is életben marad**, bármilyen a vírussal szennyezett tárggyal -pl. cipő, ruházat - átvihető a fertőzés. **Ezért fontos, hogy a parvo ellen megfelelő védettséggel még nem rendelkező kölyökkutyánkat ne vigyünk olyan helyre, ahol más kutyákkal is találkozhat (pl. kutyafuttató, kutyaiskola), és ne hagyjuk neki, hogy utcai cipőnket nyalogassa!**

A parvo leggyakrabban az **oltatlan, egy évnél fiatalabb kutyáknál** fordul elő, de minden életkorú kutyát érinthet.

Mivel a vírus felnőtt kutyákat is megbetegíthet, ezért nekik is ajánlott évente beadatni az emlékeztető oltást. (A kombinált oltás tartalmazza.)

Szopornyica / vírusos tüdőgyulladás



A szopornyica **cseppfertőzéssel terjed**, általában az alábbi testnedvek továbbítják egyik kutyáról a másikra: **vizelet, széklet, szem- és orrváladék**.

Elég, ha a kutyusunk megszaglássza vagy megnyalja egy fertőzött kutya vizeletét, és máris elkaphatja a szopornyicát. Az évente adandó kombinált oltással tudunk védekezni ellene.

Tünetek:

Mindig magas lázzal kezdődik, majd három, jól elkülönülő szakasza alakulhat ki. A kutya áteshet az összes szakaszon, de az is lehet, hogy csak egyetlen jelentkezik a három közül:

1. Kezdeti szakasz

Általában egy hétig tart, legjellemzőbb tünete a magas, **akár 41 fokal**. A betegségre ebben a fázisban az úgynevezett **kettős lázcsipke** jellemző, ami azt jelenti, hogy pár nap lázas állapot után 2-3 lázmentes nap következik, majd az állat újból belázasodik.

Megjelenhetnek a kutya combjainak belső részén sötétpiros-vörös árnyalatú kiütések, melyek felhólyagosodhatnak és belőlük gennyes váladék is szivároghat. E mellett a bágyadság, levertség, étvágytalanság is kísérheti ebben a szakaszban.

2. Hurutos szakasz

Ekkorra az állat szervezete legyengült, így további kórokozók is megfertőzhetik – szövődményeket okozva.

Az alábbi tünetek jellemzik:

-  Torokgyulladás, mandulagyulladás, tüdőgyulladás is jelentkezhet.
-  Szem váladékozás – amely a kötőhártya gyulladás tünete.
-  Tüsszögés, köhögés
-  Hányás, hasmenés is jelentkezhet a gyomor- bélgyulladás miatt
-  A kutya bőre a talppárnákon, és orrán megvastagodhat
-  A fogakon barnás elszíneződés jelenik meg – ez sajnos általában egy életre megmarad.

3. Idegrendszeri szakasz


A betegség tovább súlyosbodik. Izgatottság, ferde fejtartás, remegés és izomrángás jellemzi.

Tünetek: ferde fejtartás, körbejárás, fényérzékenység, érintéssel szembeni túlzott érzékenység, remegés, fogcsattogtatás, görcsök, bénulás.

Sajnos ezen tünetek megjelenése után a beteg állatok jelentős része elpusztul.

A gyógykezelés csak a korai felismerés és az időben elkezdett szakszerű terápia esetén lehet sikeres, így ha a fent említett tünetek valamelyikét észleljük kutyánkon, azonnal forduljunk állatorvoshoz!

Fertőző májgyulladás



Nem csak kutyákat, hanem minden kutyafélét, így rókákat is megfertőz, ezért a rókák járta területeken különösen nagy a fertőződés veszélye.

Ha gyakran járunk a vadonban, erdős területen kedvencünkkel, mindenképp javasolt a kombinált oltással való védekezés!

A fertőzött állatok a vírust főleg vizeletükkel akár 6-9 hónapon át is ürítik. Tehát egy oltatlan kutya bárhol ki lehet téve a fertőző májgyulladás veszélyének, ahol hordozó állat járhatott.

Tünetek:

- 🐾 láz
- 🐾 bágyadtság, étvágytalanság
- 🐾 szem- és orrfolyás
- 🐾 hasi fájdalom,
- 🐾 hányás, hasmenés
- 🐾 ritkán sárgaság is előfordulhat
- 🐾 vérzékenység miatt száj- és orrvérzés
- 🐾 valamint véres bélsár és vizelet jelentkezhet

A betegség jellegzetes **szövődménye**, a kék szem betegség - a szaruhártyák átmeneti, vagy tartós elhomályosodására utal - akár a gyógyulást követően több mint egy héttel is megjelenhet. Sajnos akár krónikus vesebetegség is okozhat.



Leptospirózis



A *Leptospira interrogans* baktériumokat a rágcsálók hordozzák szervezetükben, és vizeletükkel ürítik a környezetbe. A fertőzés forrása így leggyakrabban a rágcsálók vizeletével szennyezett szemét, vagy pocsolyák, állóvizek. Ezen baktériumok speciális tulajdonsága, hogy a vékonyabb vagy sérült bőrön át is bejuthatnak a szervezetbe. Így kutyusaink akár a fertőzött vízben való úszás során is fertőződhetnek. Az évente adandó kombinált oltással tudunk védekezni ellene.

Tünetek:

Három formája ismert ennek a betegségnek:

1. **A vérzéses formánál** magas láz, elesettség, étvágytalanság, véres hasmenés és hányás is tapasztalható, e mellett a szájbán, a szemgolyó fehér részén számos apró vérzés látható.

2. **A sárgasággal járó forma** gyakran a vérzéses formára jellemző tünetekkel kezdődik, majd a szem és a száj nyálkahártyája sárgás színűvé válik. Súlyos esetben a bőr is elszíneződhet.

3. **A harmadik forma** során vesekárosodás történik. A kutya elesett, étvágytalan, hányás is előfordulhat. Nyelvfekélyek kialakulása, és bűzös szájszag jellemző. További tünetek a fokozott vízivás és vizeletürítés, véres vizelet, hasi fájdalom.

A fertőzést **mi emberek is elkaphatjuk**, akár a beteg kutyától, akár rágcsáló vizelettel szennyezett ivóvíz vagy élelmiszer által. Így a leptospirózis elleni védekezés nemcsak kedvencünk, hanem **saját egészségünk megóvása miatt is fontos**.



Kennelköhögés



A **kutyák légső- és hörgőgyulladása**, mely egy igen gyakori fertőző betegség. Hátterében nem egyetlen kórokozó áll, hanem többféle vírus és baktérium együttes hatása okozza.

Leggyakrabban ***kutyaközösségekben*** terjed a betegség:

-  kutyafuttatók
-  kutyaiskola, kutyapanzió, napközi
-  kiállítások, versenyek
-  E mellett a nem megfelelő tartási körülmény is hajlamosít, ha sok kutya kis helyre van összezárva (pl. szaporítótelepek)

Tünetek:

-  száraz, görcsös köhögés, ami akár több hétig is tarthat
-  a görcsös köhögést öklendezés, hányás is kísérheti,
-  könnyezés, orrfolyás is kialakulhat a másodlagos fertőzések miatt
-  A kennel köhögés lefolyása általában 3 hétig tart. Enyhébb esetben a tünetek csak mozgás után (játék, futás stb) jelentkeznek, súlyosabb esetben nyugalmi állapotban is, és étvágytalanság és láz is kísérheti.

Orrba cseppenthető, vagy bőr alá adandó vakcinával tudod védeni ellene kutyusod, melyet szintén évente szükséges beadatnod neki.