



PETWISECARE

KUTYA ELSŐSEGÉLY E-BOOK



Köszöntő

Kedves Gazdi!

Először is hadd mutakozzam be, Dr. Piller Pálma vagyok, állatorvos, a PetWiseCare megálmodója.

Szívügyem klinikai munkám mellett a gazdik edukációja, ismeretterjesztés, és a betegség- és balesetmegelőzés oktatása. Ugyanis hiszem, hogy sokkal kevesebb állat kerülne a rendelőbe, ha a legtöbben tudnák, hogyan cselekedjenek vészhelyzet esetén. Ezért is hoztam létre ezt a könnyen érthető e-book-ot, hogy segítsék Neked felkészülni a legrosszabbra és magabiztosan cselekedni baj esetén is!

Az alábbi tananyag elsajátításával minden szükséges tudást elsajátíthatsz, ami a baleset megelőzéshez, és vészhelyzetben való helyes cselekvéshez szükséges!

A állatorvosi chatünkben az első hónapból 25% kedvezményt kapsz az EBOOK25 kuponkóddal!

Katt: <https://petwisecare.com/online-allatorvos/>



Bevezető

Mit tudsz tenni kedvencedért?

Az alábbi tananyag elsajátításával minden szükséges tudást elsajátíthatsz, ami az elsősegélynyújtás alapjaihoz szükséges.

Kérdéseidet felteheted az elsősegély tanfolyamunkon, melyet minden hónapban megrendezünk, az online tananyagot megvásárlók ingyenesen részt vehetnek rajta. Az online videós anyag megvásárlásával az Örömi Állatotthont is támogatod, és biztosíthatod magadnak a gyakorlati tudást, és az örök hozzáférést a videókhoz. A gazdisuli.hu oldalon találsz az elsősegély képzésünket, és további hasznos tananyagokat is - az e-book végén elrejtettünk Neked kuponkódokat is!

Segítségünk itt nem ér véget, ha nincs kire bízod kedvenced, képzett, megbízható, elsősegélynyújtási ismeretekkel is rendelkező szittereink szeretettel vigyáznak négylábú családtagjaidra! Látogass el a www.petwisecare.com-ra, megéri!

Most pedig vágjunk bele a tanulásba, mert rengeteg hasznos infóval készültem Neked!



Élettani alapértékek

Mik azok az élettani alapértékek?

Az élettani alapértékek olyan **biológiai paraméterek**, amelyek meghatározzák az egészséges test működését. Ezek az értékek az egészségi állapot felmérésének fontos részét képezik, azonban fontos tudni, hogy az értékek változhatnak az életkor és egészségi állapot függvényében is.

Élettani alapértékek:

Testhőmérséklet: 38,2-39,1 C°

↳ Vizsgálata: Digitális lázmérő végbélnyílásba helyezésével

Légzés: <30 / perc

↳ Vizsgálata: Figyeld meg a mellkasának emelkedését- süllyedését a kezed ráhelyezésével.

Pulzus: nagytestű kutya: 60-120 /perc; kistestű kutya: 80-120/ perc

↳ Vizsgálata: A mellkas bal oldalán a könyöke mögött, tenyeredet a kutya szívéhez nyomva. Órával mérd 1 percig

Nyálkahártya: halvány rózsaszín

↳ Vizsgálata: Az állat ínyén a legkönnyebb vizsgálni az ajkak felhajtásakor.

Rendellenes, ha kék, élénkvörös, sárga, vagy porcelánfehér! Ezekben az esetekben azonnal állatorvoshoz kell fordulni!

Kapilláris telítődési idő: = KTI

↳ Vizsgálata: A szájnálkahártyát ujjbegyünkkel megnyomva majd felengedve 1 mp-en belül visszaszíneződik fehérről rózsaszínre

+ Bőrránc teszt:

Az egészséges kutya vízháztartása megfelelő: ha ráncba emeljük, majd elengedjük a bőrét és az azonnal kisimul. Abban az esetben, ha a kutya dehidratált, lassan simul ki a bőre, azonnal állatorvoshoz kell fordulni!



Klinikai alapértékek checklista- a saját kutyusodnak



Testhőmérséklet: 38,2-39,1 C°

A Te kutyusod testhőmérséklete: C°

Légzés: <30 / perc

A Te kutyusod légzésszáma:..... / perc

Pulzus: nagytestű kutya:
60-120 /perc; kistestű kutya: 80-120/ perc

A Te kutyusod pulzusa:..... /perc

Nyálkahártya: halvány rózsaszín

A Te kutyusod nyálkahártyája:színű

Kapilláris telítődési idő: <2 sec

A Te kutyusod kapilláris telítődési ideje:sec



Elsősegélynyújtás - rögtönzött szájkosár

Fontos!

Az elsősegélynyújtási ismeretek nem helyettesítik az állatorvosi ellátást és állatorvosi konzultációt sem!

Az elsősegély alkalmazásával a **kutya pillanatnyi állapotán tudunk javítani**, amíg eljutunk vele az állatorvoshoz, lényegében szállítható állapotba hozva az állatot. Vannak súlyos, akut helyzetek, amiknél először elsősegélyt kell biztosítani, mert enélkül az állat már az állatorvosi rendelőbe szállítás előtt nagy eséllyel életét veszítené!

Az elsősegély által:

- 🐾enyhíthető a kutya fájdalma,
- 🐾megelőzhető a további egészségkárosodás,
- 🐾bizonyos életveszélyes helyzetekben életet menthetsz, ha helyesen jársz el

Feltétlenül állatorvoshoz kell szállítani a kutyát, amennyiben a következőket tapasztalod:

- 🐾Nyílt seb
- 🐾Égési sérülés
- 🐾Törés, trauma, magasból való lezuhanás
- 🐾Vágott, szúrt, harapott seb
- 🐾Közúti baleset
- 🐾Mérgezési tünetek
- 🐾Sokk

Ha szükséges, továbbá a kutya sérülése engedi, tegyél rá szájkosarat, nehogy félelmében, fájdalmában megharapjon téged! Kérj segítséget: szólj a szomszédnak, vagy a környezetekben lévőknek, hiszen a sérült kutya ellátása, főleg nagytestű kutya esetében, egyedül nehéz feladat lehet.



Rögtönzött szájkosár készítése otthon:

- ✔ Használd rugalmas pólyát, sálát, harisnyát vagy bármilyen puha kötözőanyagot. Fogd meg a 2 végét, úgy, hogy a közepe a kutya álla alatt legyen!
- ✔ Köss egy sima csomót az orrháton úgy, hogy a képződő hurok közrefogja a kutya száját és orrát is! Ha helyesen csinálod, és elég szoros, akkor a kutya szája teljesen összezáródik, és a nyelve sem lóg ki.
- ✔ Ezután a kötszer szabad végeit vezesd lefelé, majd a kutya álla alatt is csinálj egy hurkot.
- ✔ Ezt követően pedig a tarkó felé húzd a kötszer szabad végeit, majd a tarkón köss egy szoros masnit. Nem kell aggódni, a kutyus a szorosnak tűnő „szájkosár” ellenére is megfelelően kap levegőt.
- ✔ Tarts fenn folyamatos feszességet, egészen addig, míg a tarkón el nem készíted a szoros masnit. Fontos: ha kissé lazára sikerült, de van még kötözőanyagod, akkor ne vedd le a félig sikerültet, hanem csak helyezz fölé egy rendeset, ezzel időt takarítasz meg, illetve nagyerejű kutyáknál van olyan, hogy az első ilyen kötés sosem lesz elég erős, mert hatalmas erő van a rágóizmaikban.
- ✔ Érdeemes először nem éles helyzetben kipróbálni, hanem már előre otthon begyakorolni egy nyugodt, barátságos kutyán, akit már jól ismersz. Fontos: végig úgy vezesd a kezeidet, és a kötszer hosszát is úgy alakítsd ki, hogy a kezeid mindig biztonságos távolságban legyenek a kutya szájától! Vigyázz, hogy meg ne harapjon az állat a művelet közben! Ez a kötés tökéletesen alkalmas a szájból történő vércukor mérés kivitelezéséhez is, csipkedős, kissé harapós kutyáknál.
- ✔ A kötés leszedése a masni oldásával, majd a kutya orra felé való lágy húzásával, ide-oda mozgatásával érhető el anélkül, hogy a kezeiddel közelebb kellene nyúlnod a szájához.

Brachycephal kutyák (pl: mopsz, bulldogok) esetén, ha mindenképp indokolt a használata, akkor alkalmazzuk a számukra kialakított, speciális szájkosarat, vagy töröküzővel tekerjük körbe lazán a nyakát, így nem fog tudni hátrakapni!

Rögtönzött szájkosár készítése

Hurok a levegőben



Csomó az orrháton




Masni a tarkón

Csomó az áll alatt




Rögtönzött szájkosár készítése


Hurok a levegőben



Csomó az orrháton



Masni a tarkón



Sebkezelés - fedőkötés

A sebkezelést mindig tisztítással kezdjük: tiszta vízzel, majd hígított betadine oldattal tisztítsuk meg a sebet. Ha nagyobb a seb, vagy kétségeink vannak, forduljunk állatorvoshoz! A sebek 24 órán belül varrhatók össze, tehát ennél többet ne késlekedjünk, beszéljünk a gazdival, és ha szükséges, szállítsuk állatorvoshoz a kutyát.

Nagyon fontos, hogy megakadályozzuk a seb nyalogatását, hiszen ez nagyon hátráltatja, megnyújtja a sebgyógyulást. Egyrészt mechanikai izgalom éri a sebet, másrészt a nyálukkal a kutyák rengeteg baktériumot kennek a sebbe. Az állatorvosnál vásárolhatunk védőgallért erre a célra, azonban amíg eljutunk az állatorvoshoz, nekünk kell ügyelni a seb nyalogatásának megakadályozására! Ha van otthon korábbról megtartott gallér, helyezzük fel a kutyára, hogy ne piszkálja a sebet, amíg eljut az állatorvoshoz.

Hajszáleres vérzés

Kis mennyiségű, szivárgó, piros vér ürül a sebből. Enyhe, felületi horzsolás, vágás okozhatja.

A teendők:

- 1.Helyezz a kutyára szájkosarat, majd fektesd olyan testhelyzetbe, hogy könnyen hozzáférj a sérüléséhez!
- 2.Vízzel mosd le a seb környékét, tisztítsd meg, a seb közepétől kifelé haladva, úgy, hogy a seb fölötti területre ne kerüljön folyó víz, mert úgy csak belemosnánk a sebbe a szennyeződések!
- 3.Fertőtlenítsd le a sebet hígított Betadine oldattal!
- 4.Helyezz steril fedőkötést a sebre: néhány darab steril gézlapot teszünk a sebre, majd steril mullpólyával körbetekerjük a lábvégtől a test felé haladva egymást fedő pólyamenetekkel. Kívülről ragasztószalaggal (leukoplast), illetve rugalmas kötszerrel rögzítjük. Fontos, hogy ne legyen túl szoros a kötés, mert ezzel keringési rendellenességet okozhatunk, főleg a lábvégen. Ha a másik oldalon aláfér az ujjbegyed, akkor megfelelő.

Fedőkötés készítése

Steril gézlap a sebre



Köretekerés mull pólýával



Rögzítés rugalmas pólýával



Rögzítés ragasztószalaggal

Sebkezelés - nyomókötés

Közepes erekből történő vérzés

Nagyobb mennyiségű vér folyik vagy ömlik a sebből. Szúrt, harapott, vágott seb esetén számíthatunk erősebb vérzésre. **Minden bőrön áthatoló trauma állatorvosi ellátást igényel!** Szúrt sebet okozhat egy kaktusz is, azok környezetében ne játssz a kutyával, ugyanis heves játék közben akár fel is nyársalódhat a kaktuszon! Harapott seb esetében, akkor is állatorvosi ellátás szükséges, ha egyáltalán nem vérzik kifelé, ugyanis okozhat belső vérzést vagy légmellet is, ami életveszélyes állapot. Vágott seb esetében mindig szükséges fedőkötést felhelyezni, amíg állatorvoshoz érsz vele!

Enyhe, szivárgó vérzés esetén

Ugyanaz a feladatod, mint hajszáleres vérzés esetén: a sebtisztítás után helyezz fedőkötést a sebre!

Nagyfokú, ömlő vérzés

Ilyenkor a vérzés csillapítása az elsődleges feladat a seb ellátása előtt, **így egy szorító kötés** felhelyezésével kezdünk: például egy gézcsíkkal, vagy bármilyen anyaggal – amivel el tudod szorítani a végtagot **a seb felett**. Ezt szorosan, csomóra kötjük. Később nyomókötés felhelyezése után a szorítókötést 15 percenként lazítsuk meg 15-20 másodpercre, hogy ne szorítsuk el a teljes vérellátást!

A szorító kötés felhelyezése után tisztítsd meg, és fertőtlenítsd a seb környékét, a seb közepétől kifelé haladva. **Alkalmazz steril nyomókötést:** a sebre steril gézlapokat helyezünk, erősen rányomjuk, erre pedig egy steril pólyatekercset vagy gézhengert nyomunk. Ez minél vastagabb, annál nagyobb a nyomó hatása. Körkörösén felhelyezett pólyamenetekkel rögzítjük a végtag körbetekerésével, ügyelve, hogy végig feszes és szoros maradjon a pólya. Ha átvérzik, nem vesszük le, hanem újabb réteget csavarunk köré. A kötés szorossága akkor megfelelő, ha a másik oldalon aláfér az ujjbegyed.

Azonnal vigyük állatorvoshoz a nyomókötés felhelyezése után, mert a nagy mennyiségű vérvesztés életveszélyes lehet! Erős vérzésnél ellenőrizd a kutya szájnyálkahártyáját, ha kezd fakulni, az súlyos vérvesztés jele! Ebben az esetben a sokk kialakulása fenyeget, minél hamarabb vidd állatorvoshoz!

Artériás vérzés

A sebből lüktetve élénkpiros vér spriccel.

Azonnal **nyomókötést** helyezünk a sebre. A sebre steril gézlapokat helyezünk, erősen rányomjuk, erre pedig egy steril pólyatekerccset vagy gézhengert nyomunk. Ez minél vastagabb, annál nagyobb a nyomó hatása. Körkörösen felhelyezett pólyamenetekkel rögzítjük a végtag körbetekerésével, ügyelve, hogy végig feszes és szoros maradjon a pólya. Ha átvérzik, nem vesszük le, hanem újabb réteget csavarunk köré. A kötés szorossága akkor megfelelő, ha a másik oldalon aláfér az ujjbegyed.őűő

Vénás vérzés

Enyhe szivárgó vérzésnél **fedőkötés** elegendő.

Ha nagy mennyiségű vér ömlik a sebből, **szorító**, majd **nyomó** kötést helyezünk fel. A szorító kötést eltávolíthatjuk a nyomókötés felhelyezése után, de minden esetben lazítsuk meg pár másodpercre, hogy ne szorítsuk el a vérkeringést!

TILOS szorító- és nyomó kötést felhelyezni nyaki ütőeres és vénás vérzés esetén! Ilyen esetben steril pólyatekerccset szorítsunk a vérzés helyére, amíg orvoshoz érünk vele!

Harapott és szúrt seb esetén haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz!

Ha idegen test szúródott a sebbe – (akár egy faág), azt soha ne távolítsuk el, vigyük azonnal állatorvoshoz a kutyát!



Szorítókötés felhelyezése



Nyomókötés felhelyezése

Steril gézlap +
pólyatekercs a sebbe



Pólyamenetekkel
körbetekerjük



Steril gézlap +
pólyatekercs a sebbe



Rugalmas pólyával
rögzítjük



Egyéb egészségügyi esetek ellátása

Kullancs biztonságos eltávolítása:

Egy csipesz segítségével fogjuk meg a kullancsot olyan közel a kutya bőréhez, amilyen közel csak tudjuk! Vigyázzunk, hogy a kullancsot ne nyomjuk össze a csipesszel, próbáljuk csak a feji részét megfogni! Majd miközben húzzuk, óvatos csavaró mozdulatot végezzünk.










A kullancs eltávolítása után a helyét betadine oldattal kenjük be. Jelezzük a gazdinak, és ha kéri akkor a kullancsot küldessük be PCR vizsgálatra az állatorvossal. Javasoljuk a gazdinak a kullancs-bolha elleni védelem megújítását.

Csípések

Tünetek súlyosabb esetben anafilaxiás sokként is jelentkezhetnek!

Ha a kutya allergiás a méh csípésére, akkor súlyos tünetek, úgynevezett anafilaxiás sokk alakulhat ki.

Ennek jelei:

-  neheztett, szapora légzés,
-  szapora szívverés,
-  bedagad a nyelve, a torka, nem kap levegőt, nem tud nyelni, fullad (gégeödéma miatt),
-  légzéskor szokatlan, szörcsögő hangot ad ki (tüdőödéma),
-  hány, hasmenése van,
-  lázas,
-  izomfájdalma, izomgörcse van,
-  nehezen tud mozogni,
-  sápadt az ínye








Ha a fentiek közül bármelyik tünetet tapasztalod, sürgősen szakszerű ellátásra és kombinált kezelésre van szükség, tehát azonnal irány az állatorvos! Ne késlekedj, minden perc számít! Különösen veszélyes, ha például a méh vagy darázs szúrja meg véreren vagy a nyak, száj, nyelőcső területén.

Légy alapos! Kérdezd meg a gazdit, hogy a kutya védett-e kullancsok és bolhák ellen, mikor volt utoljára féregajtva! Mindezzel nemcsak, hogy jó pontot szerezhetsz a gazdinál, de egyből megtudhatod azt is, veszélyes-e a kutyust védelem nélkül kullancsos helyen sétáltatnod, vagy más állatokkal összeengedned!





Kihűlés

Tünetek:





Kezdeti állapotban

-  levertség,
-  reszketés,
-  lelassult mozgás,
-  sápadt, színtelen íny,
-  csökkent éberség, tompultság.

Előrehaladott állapotban

-  kábultság,
-  lassú légzés,
-  alacsony vérnyomás,
-  merevvé válnak az izmok, már nem reszket.

Súlyos állapotban

-  halk szívverés,
-  sokkos állapot,
-  merev és tág pupillák,
-  nehézlégzés, kóma.



Mi a teendő kihűlés esetén?

1. Vidd be azonnal kutyádat egy **meleg helyiségbe**. Szüntesd meg a lehűlést okozó körülményeket!
2. Ha sokkos állapotban van, enyhítsd haladéktalanul a tüneteket (lásd: sokk)!
3. Szárítsd meg törülközővel (ha az átázott, azonnal cseréld ki)! Amint a kutya megszáradt, tekerd körbe 2-3 száraz törülközővel vagy pléddel, hogy lassan, egyenletesen melegedjen fel!
4. Húzz a lábaira zoknit - fontos a **lábvégek felmelegítése!**
5. Hajszárítóval, melegítőpárnával segítheted a kutya testhőjének emelkedését!
6. Ilyenkor a fő cél, hogy a végbélben mért hőmérsékletet minimum **37,0 C° fölé tornásszuk fel!**








Ne tegyél a kutyára semmilyen forró dolgot, és semmiképpen ne helyezd meleg vizes fürdőbe!



Hőguta

Ha meleg a külső hőmérséklet, SOHA ne hagyd a kutyát a kocsiban, még néhány percre sem! Az autó pillanatok alatt felforrósodik, az állatok pedig nagyon könnyen hőgutát kapnak.

Tünetek:

-  gyors, erőteljes lihegés, nehézlégzés, szörcsögő hang, megvastagodott, ragadós nyál, szájhabszás, habos orrváladék,
-  40 °C feletti testhőmérséklet,
-  tág pupillák,
-  duzzadt, lilás nyelv, a szájnyálkahártya vörös, szürkés árnyalatú,
-  szapora szívverés,
-  hányás, hasmenés,
-  imbolygó járás, roham, sokk, megmerevedés, eszméletvesztés, kóma.

Mi a teendő hőguta esetén?

Ha egyértelműen túlhevült, akkor azonnal kezd meg a kutya lehűtését, még mielőtt orvoshoz viszed.

1. Vidd gyorsan árnyékos helyre vagy hűvös (18-20 °C-os) helyiségbe.
2. Ha sokkos állapotba került, haladéktalanul enyhítsd a tüneteket. – lásd: sokk hivatkozás. Ha nincs sokkos állapotban, adhatsz, csapvíz hőmérsékletű vizet (inkább többször, keveset). Ha nem akar inni, akkor ne erőltesd, és ne öntsd a szájába, mert félrenyelhet! Inkább nedvesítsd meg a nyelvét, száját, fülét és lábvégeit vizes szivaccsal.
3. Itass át egy (vagy több) törülközőt vagy lepedőt csapvízzel, és terítsd rá úgy, hogy érintse a nyakát (a füleit hagyd szabadon), a hónalját, a lágyékát, és a hasát. A végtagjait is csavard be nedves ruhával. A lehűtésére használt törülközőt vagy lepedőt cseréld gyakran.



4. Ne locsold jéghideg vízzel, rakd hideg vizes kádba/ medencébe és ne tegyél jeget a kutyára! A túl drasztikus hűtés eredményeként megállhat a szíve!

5. Mérd meg a testhőmérsékletét 5 percenként végbélen keresztül. Abban a pillanatban, ahogy elérte a 39,5 °C-ot, hagy abba a hűtést. (Ha nincs nálad lázmérő, akkor, ha azt látod, hogy a kutya jobban van, kifejezőbb a tekintete, érdeklődő, esetleg lábra áll, nem remeg a lába, abbahagyhatod a hűtést.)

6. Ezután azonnal vidd az orvoshoz. Szállításnál beteheted lehűtött autóba, de ügyelj arra, hogy 20-22 °C-nál ne legyen bent hűvösebb.

Az orvosi megfigyelés mindenképpen fontos még a későbbiekben is, mert a túlhevülés komplikációkkal járhat!

Amit tenni tudsz, ha már megtörtént a baj:


- ✔ Hidegvizes törölközővel tekerjük be az állat testét!
- ✔ Kerüljük a direkt napfényt, tartsuk árnyas, hűvös helyen az állatot!
- ✔ Pár percenként nedvesítsük újra a törölközőt, ha az átmelegedett!
- ✔ Amilyen gyorsan csak lehet, szállítsuk állatorvoshoz





Vércukorszint leesése:


Kistestű kutyában:

 Mivel testméretüknél fogva kevés szénhidrátot raktároznak, ha hirtelen megerőltetés vagy hosszabb játék során megnő a szervezet szénhidrát igénye, nem tud a raktárakból elegendőt felszabadítani, így leesik a vércukorszintjük. Ekkor gyorsan méz vagy cukor oldat szájnyálkahártyára kenésével orvosolhatjuk a problémát. Stressz, hányás, hasmenés is okozhat náluk vércukor esést.

 A tartósan alacsony vércukorszint görcsökhöz, kómához vezethet!


Kölyök kutyákban:

 Súlyos parazitás fertőzöttség, valamint helytelen táplálás okozhatja.

 Szintén méz vagy cukoroldat adásával/ ínyre kenésével kezeljük.


 Kistestű kölyökkutyákban különösen gyakran előfordulhat.


Cukorbeteg kutyában inzulin túladagolás miatt:

 Akkor fordulhat elő, ha nem eszik, vagy hány inzulinadagolás mellett, esetleg túladagoltuk az előírt inzulin adagját.

 Fontos, hogy az inzulin beadás előtt etessük meg a kutyát!

 Ha hányt, vagy nem eszi meg az ételét, csak az inzulin adagja felét adjuk be!

 Kenjünk mézet a szájnyálkahártyára!





 Ha többször is előfordul hányás vagy étvágytalanság, konzultáljunk a gazdival, és vigyük állatorvoshoz a kutyát!

A sokkos kutya

A sokk kezelése





Mi az a sokk? A sokk hirtelen kialakult, súlyos keringési elégtelenséget jelent, amely az életfontosságú szervek oxigénhiányos állapotához és az anyagcsere-folyamatokban kialakult súlyos károsodáshoz vezet. A sokk által kiváltott reakciók a kezdeti szakaszban visszafordíthatók, azonban a tünetek hosszabb ideig való fennállása esetén egyes szervek visszafordíthatatlanul károsodhatnak, így a kutya élete is veszélybe kerülhet.

Kiváltó okai lehetnek:







-  Szív eredetű
-  Súlyos vérvesztés
-  Súlyos bakteriális fertőzés (széptikus sokk)
-  Allergiás reakció (anafilaxiás sokk)


A sokk életveszélyes állapot, esetében azonnal állatorvoshoz kell fordulni!

A sokkos állapot tünetei:

-  Gyenge pulzus
-  Felületes légzés
-  Kábultság
-  Esméletvesztés

A sokk kezdeti szakaszában:

-  Szürkés rózsaszín íny, halvány kötőhártya
-  2-3 másodpercbe telik, amíg az íny visszanyeri eredeti színét ujjbeggyel való megnyomás után
-  Percenkénti légzésszám több, mint 30
-  Pulzus magasabb, mint 150/ perc
-  Bágyadt, tompult tekintet
-  38 °C alatti testhőmérséklet



A sokk előrehaladott szakaszában:

- 🐾 Kékesszürke, vagy porcelánfehér ín
- 🐾 Nyomás után 4 mp-be is telhet az ín visszaszíneződése
- 🐾 Lassú, felületes légzés
- 🐾 Lassú szívverés
- 🐾 Pulzus nehezen, vagy egyáltalán nem tapintható
- 🐾 Alacsony, 37 °C alatti testhőmérséklet

Fontos, hogy tegyük szabaddá a légutakat a száj kinyitásával és a nyelv kihúzásával, amennyiben a kutya nincs eszméleténél. Eszméleténél lévő kutyának is tilos inni vagy enni adni ilyenkor!

Amíg az orvoshoz értek, enyhítsd a sokk tüneteit a következőképpen:

1. **Tartsuk az állatot melegen, biztosítsunk csendes környezetet!** Hozz takarót, kabátot vagy törülközőt, ugyanis sokkos állapotban a nem megfelelő vérkeringés miatt kihűlhet! Takard be lazán úgy, hogy biztosítsd a szabad légzést! **Hőguta esetén tilos** betakarni, kiszáradás esetén pedig csak akkor tedd, ha alacsony a testhőmérséklete.

2. **A fogínyét kend be mézzel** (nagytestűeknél: 1 evőkanál, kistestűeknél: 1 mokkáskanál a szükséges mennyiség). Ezzel emeled a leesett vércukorszintjét, és energiát adsz neki. **Fontos: cukorbeteg kutyánál ezt a lépést hagyd ki!**

3. A sokkos állapot enyhítése után azonnal **irány az állatorvos**, hiszen mind a sokkot, mind a kiváltó okot haladéktalanul kezelni kell. Amennyiben a kutya nincs szállítható állapotban, konzultálj az állatorvossal, hogy mit tegyel.





4. Ha a kutya tudatánál van, de sokkos állapot alakult ki, **ne adj neki enni vagy inni**, mert félrenyelhet, illetve ne hagyd, hogy mozogjon! **Hideg vizes ruhával viszd a száját, a nyelvét, illetve a fejét benedvesítheted.**



Mérgezések, háztartási veszélyek

Mérgezések:

Legjellemzőbb tünetek:

-  Előfordulhat nyugtalanság, tántorgás, lihegés, légzési nehézség, hányás, hasmenés, szapora szívverés, görcsös rohamok, merevség.
-  Sok esetben a kutya bágyadt, nem mozog, nincs étvágya, szájnyálkahártyája sápadt, porcelánfehér, a testhőmérséklete lecsökken.
-  Vannak azonban olyan mérgezések is, melyek hatására megemelkedik az állat testhőmérséklete. Megváltozik az eb viselkedése, pl.: keservesen sír, de az is előfordulhat, hogy teljesen megvadul.
-  Ezeket a tüneteket észlelve azonnal értesíteni kell a tulajdonost, és állatorvoshoz kell szállítani a kutyát!

Kutyák számára mérgező ételek:

Csokoládé: A csokoládében levő kakaó egy theobromin nevű vegyületet tartalmaz, mely az állatok számára mérgező. Minél nagyobb a csoki kakaótartalma, annál nagyobb a kockázat is, vagyis a magas kakaótartalmú étcsokoládék nagyobb veszélyt jelentenek kedvenceinkre, mint a tejsokoládék. Egy 10 kg-os kutya már 300g tejsokoládé vagy 100g étcsokoládé elfogyasztásától is elpusztulhat! Ügyeljünk rá, hogy a kutya ne férhessen hozzá csokihoz vagy bármi egyéb kakaótartalmú süteményhez! Sose hagyjunk ilyen ételleket a kutyával egy helyiségben, felügyelet nélkül!

Szőlő, mazsola, ribizli: Ezekben a gyümölcsökben a kutyák számára veszélyes toxinok vannak. Tilos ilyennel etetni őket, illetve figyeljünk, hogy ne is tudjon elcsenni belőle!

Fokhagyma, hagyma, snidling: A hagymák organoszulfoxid nevű vegyülete okoz mérgezést kutyákban, abban az esetben, ha több napon keresztül eszik belőle az állat.

Csonthéjas gyümölcsök magja: A cseresznyemag, barackmag, szilvamag cianid tartalma mérgező a kutyák számára (ahogy az emberek számára is)! Ugyan nagy mennyiség elfogyasztása lenne szükséges a mérgezés kialakulásához, ezek a nagyobb magvak bélelzáródást is okozhatnak a kutyáknál, így semmiképp sem tanácsos hagyni, hogy elfogyassza ezeket a kutya.

Avokádó: A magja lenyelve bélelzáródást okozhat, így ügyeljünk rá, hogy a kutya véletlenül se játsszon vele, ne egye meg. Persint tartalmaz a héja, levelei, és kis mennyiségben a húsa is, mely a kutyák számára mérgező vegyület, hányást, hasmenést okoz!

Makadámdió, sósmogyoró: Remegést, gyengeséget és gyomorpanaszokat okozhatnak.

Só: A só nagyobb mennyiségű bevitele rendkívül mérgező! Fontos megjegyezni, hogy nemcsak ételekben juthatnak hozzá: a mosogatógép tabletták és fürdősók is veszélyt jelentenek!

Alkohol: Az alkoholos italok mérgezőek az állatok számára. Ezen kívül sok háztartási termék is tartalmaz alkoholt, mint a szájvíz, parfümök, aftershave vagy a különböző ragasztók.

Xylitol: Rendkívül mérgező a kutyák számára. Napjainkban kedvelt, gyakori édesítőszer. Megtalálható például cukormentes rágógumikban, diabetikus édességekben, süteményekben, fogkrémekben. Ha észrevesszük, hogy a ránk bízott kutya xylites ételt evett, azonnal induljunk az állatorvoshoz, mert nagyon gyorsan halált okozhat! A vércukorszint hirtelen leesését, görcsöket kialakulását okozza, továbbá májkárosító hatással is rendelkezik. A xylitol tartalmú étel elfogyasztását követően már 30-60 perccel kialakulhatnak a tünetek. 0,1g/ttkg is mérgező dózis a kutyák esetében.

Koffein: Ez nagyobb mennyiségben okoz gondot az állatoknak. Ne hagyjunk elől kutyák és macskák számára hozzáférhető helyen teafüvet/ filtereket, kávé, energiatalt, illetve humán fájdalomcsillapítókat.



Háztartási veszélyek

Háztartási veszélyek

Fagyálló: Édes íze miatt nagyon vonzó kutyák és macskák számára, de a szándékos mérgezések is gyakoriak. Szezonális mérgezésnek számít, leginkább novembertől márciusig. Idegrendszeri tüneteket és veseelégtelenséget okoz, ha rózsaszín-lilásat hány az állat akkor mindig gyanakodni kell rá! Ha élénk rózsaszínű virsli darabokat hány, szintén erre kell gondolni, és azonnal állatorvoshoz vinni, ugyanis sokszor virslivel itatják fel a mérget a rosszakarók.

Rágcsálóirtó

Csigairtó: extrém magas láz, hányás, (kékes-zöldes) hasmenés jellemző rá.

Rovarirtók, gyomirtók

Humán láz- és fájdalomcsillapító gyógyszerek: TILOS állatorvossal történő egyeztetés nélkül, humán gyógyszert adni az állatoknak! Nagyobb bajt tudunk okozni vele, mint gondolnánk. Ha bármi rendellenesség jelentkezik a rád bízott kutyán, beszélj a gazdival, és vidd állatorvoshoz!

Példa: Aspirin, Cataflam, Ibuprofen - fontos, hogy sose adjunk humán gyógyszert az állatnak! Ha fájdalom, betegség jeleit észleljük, mindig értesítsük a tulajdonost, majd vigyünk állatorvoshoz a kutyát!



Elemek: erős savakat tartalmaznak, így, ha egy kutya megrágja komoly károkat okoz a szájában, nyelőcsövében és gyomrában. Nehézlégzés és nyálzás kísérheti tünetként.

Szemeteszsákok, kukák: figyeljünk rá, hogy ne tudják kinyitni/ felborítani a kukát, hiszen az ételszagnak a legtöbb kutya nem tud ellenállni. A romlott ételek és a sok szemet miatt komoly emésztőszervi gondokat okozhat egy kuka kifosztása.

E-cigaretta: a benne található folyadék erősen toxikus az állatok számára. Nagy mennyiségű nikotint tartalmaz, melynek felvétele könnyen halálhoz vezethet az állatoknál. Ezen kívül, ha hozzáfér és megrágja, a cigaretta üvegdarabjai is sérüléseket okozhatnak az emésztőrendszerben. Semmiképp ne férhessen hozzá a kutya egy E-cigarettához!

Egyéb dohánytermékek: semmilyen dohánytermékhez nem szabad hozzáférniük az állatoknak!

Veszélyes elektronikai eszközök: Hordozható fűtőberendezések: sose hagyjuk felügyelet nélkül a kutyát egy helyiségben gyúlékony, hőt sugárzó készülékekkel. Ha felborítja, könnyen tűz ütethet ki.

Vezetékek, kábelek: nagyon csábító lehet a legtöbb kutya számára a kábelek megrágása. Erre nagyon figyeljünk oda, ha hajlamos rá a kutya, ne hagyjunk elől áram alatt lévő vezetékeket!



Mérgező növények

Mérgező növények:

Rhododendron: már néhány levél elfogyasztása is súlyos mérgezést okozhat!

Ricinus (Ricinus communis): a magok és a zöld részek elfogyasztása is extrém módon mérgező a kutyák számára, könnyen halálos lehet!

Vadgesztenye és makk: az általuk okozott mérgezés, ami hányást okoz, ritka a kutyák között. Lényegesen gyakoribb, hogy a termésük idegentsétként bélelzáródást okoz. Ügyeljünk rá, hogy a kutya ne tudja elfogyasztani egyiket sem!

Nárcisz (Narcissus): minden része nagyon mérgező! Ha a vágott virág vizéből iszik a kutya, az is mérgezést okozhat!

Aranyeső (Cytisus alpinus): Minden része mérgező a kutyák számára, többek között a gallyak megrágása is.

Tiszafa (Taxus baccata): a növénynek szinte minden része mérgező, 30g levél elfogyasztása már halálos a kutyák számára!

Gyöngyvirág (Convallaria majalis): a virága és levelei okoznak mérgezést kutyákban és macskákban is, melynek tünetei: hányás, hasmenés, szívműködési zavarok.

Liliom (Lilium): a szár, levél és virág is mérgező, már a megrágásuk is veszélyt jelent az állatra! Még a liliomcsokrot tartó váza vize is mérgező!

Filodendron (Philodendron): a növény minden része mérgező, de általában a levelek megrágása okozza a gondot. Szem- és bőrirritációt, illetve nyálzást okozhat!



Ha arra gyanakszol, hogy kedvenced valami károsat evett, kérdezz minket az állatorvosi chaten akár ügyeleti időben is!

A állatorvosi chatünkben az első hónapból 25% kedvezményt kapsz az EBOOK25 kuponkóddal!

Katt: <https://petwisecare.com/online-allatorvos/>

Mikor lehet hasznos a chat?

- **Ha nem tudod, hogy azonnal indulj az állatorvoshoz, vagy csak túlaggódod, vagy ráér holnapig?**
- **Ha jól jönne egy mindig elérhető állatorvos, akitől bármikor tudsz kérdezni**
- **Ha elfelejtettél valamit megkérdezni a rendelőben**
- **Ha táplálással, gyógyszer adagolással, allergiával kapcsolatos kérdésed van**
- **Ha laborlet elemzésre van szükséged/ nem érted a kórlapot**
- **Ha SOS segítségre van szükséged**
- **Ha másodvéleményre van szükséged**
- **Ha megnyugtatóra van szükséged**



Egyéb veszélyek

Közúti baleset:

Gázolás során előfordulhat, hogy nem történik a kutyán kívülről látható változás, azonban ha ilyen baleset történik, mindenképp vigyük a kutyát állatorvoshoz ellenőrzésre, mert lehet belső vérzése, rekeszizom sérve, húgyhólyag repedése is akár.

Sok esetben végtagtörés vagy medencetörés a gázolások eredménye. Ha erősen vérzik, szükséges lehet szorítókötés felhelyezésére, amíg elérünk az állatorvoshoz!

Végtag törés

Ne mozgassuk a törött végtagot! Igyekezzünk mozdulatlanul tartani az állatot, amíg állatorvoshoz szállítjuk! Fektessük a kutyát egy nagy plédre, ezen hordozzuk, hívjunk segítséget!

Égési sérülés:

Ha még friss a sérülés, még nem látszanak a különböző fokú égés tünetei:


1. Az égett területet hideg csapvízzel vagy törülközőbe csavart jégzsélével/ jéggel / fagyasztott zöldséggel hűtjük 10-15 percig. Fontos, hogy közvetlenül NE érintsünk a sebhez semmilyen hűtésre szolgáló tárgyat, csakis valamilyen textilbe tekerve!

2. Hideg csapvízzel nedvesítsünk be néhány gézlapot, majd körkörösén rögzítsük steril rugalmas pólyával.

3. Azonnal juttassuk el a kutyát állatorvoshoz! Ő majd megállapítja az égési sérülés súlyossági fokát, illetve elvégzi a további kezelést.

4. Adhatsz inni a kutyának, ha nincs sokkos állapotban, és elfogadja a vizet.



 Ha az égés régebben történt, már csak az I., II., vagy III. fokú égés kialakult tüneteit látod:

Az ilyen jellegű égési sérüléseket nem kell hűteni.

1. Kis felületű sérülés esetén néhány darab steril, hideg csapvízzel benedvesített gézlapot, helyezünk a sebre, majd steril rugalmas pólyával körkörösén rögzítsük, úgy, hogy ne legyen túl szoros, fájdalmat keltő, de ne is mozduljon el. A seb bekötése után azonnal vigyük a kutyát az orvoshoz!





2. Nagyobb felület esetén is fontos, hogy meggátoljuk a seb kiszáradását. Egy nedvesített tiszta törülköző, ruhadarab vagy lepedő megfelelő lehet erre a célra. Feltételezhetően III. fokú égési sérülés történt, ha nagy hámphányos területeket, fekete, elszenesedett vagy fehér, hólyagosan felpuffadt bőrfelületet látunk.



Félrenyeléses fuldoklás, Heimlich- manőver

 **A félrenyelés okozta fuldoklás leggyakrabban evéshez, iváshoz kötötten fordul elő.**

Tünetetek:

-  nehéz légzés
-  száj mancsolása
-  köhögés
-  szájnyálkahártya elkékülése

Teendők:


Nyissuk ki a kutya száját, nézzük meg, hátha ki tudjuk húzni az elakadt idegentestet!

Ha nem sikerült, végezzük el a Heimlich-manővert:

- **Nagy testű kutya esetén:** álljunk a kutya mögé! Az utolsó bordák magasságában nyúljunk a hasa alá, majd ökölbe szorított kézzel gyakoroljunk felfelé és előre irányuló nyomást a kutya hasára. Ezt végezzük el 4-5-ször egymás után 1 percen belül. Ha nem kezd el lélegezni, végezzünk mesterséges lélegeztetést ezután!
- **Kis testű kutyánál:** vegyük kezünkbe, és tartsuk a mellkasunk elé a kutyust, úgy, hogy a hátát támasszuk a mellkasunknak! Majd gyakoroljunk befelé és felfelé irányuló nyomásokat a hasára a bordakosár mögött!



Újraélesztés

 Csak akkor szabad újraélesztést alkalmazni, **ha a kutyának nincs légzése/szívverése**. Ha eszméletlen, de van szívverése és légzése is, tilos újraélesztést alkalmazni, ilyenkor azonnal állatorvoshoz kell szállítani. Hogy eszméleténél van-e a kutya, a belső szemhéj érintésével ellenőrizhetjük. Amennyiben, erre pislogással reagál, nincs szükség újraélesztésre.


Eszméletlen a kutya, ha nincs légzése és szívverése. Ha van szívverése, de nincs légzése, mesterséges **lélegeztetést kell alkalmaznod**.

Ha szívverése sincs, szívmasszázszt is kell alkalmaznod a kutyán.


- A kutyát jobb oldalára fektetjük szilárd felületen.
- Légutak szabaddá tétele, nyelv kihúzása, majd a száj bezárása.


Szívmasszázs:

 A kutya háta felől helyezkedjünk


 A bordákhoz képest 90°-ban legyen a két kezünk, összekulcsolva, a bordacsont-bordaporc átmenetnél.

 Nagytestű kutyánál a mellkas legszélesebb pontját nyomjuk ritmusosan, egymásra helyezett tenyérrel.


 Kistestű kutyánál csak az ujjainkat helyezzük a mellkasára és úgy nyomjuk, kisebb erővel, nehogy eltörjük a bordákat!

 Ritmusa: „**Stayin' alive**” zene ritmusának megfelelő ütemben, percenként 80-100 nyomás.

Mesterséges lélegeztetés

 Minden 30. nyomás után 2 befújás az orron keresztül.

Minden 3-4. kör után ellenőrizni kell a szívverését, lélegzését!

 A száját tartsuk zárva, miközben az orrába fújunk, erre meg kell emelkednie a mellkasának, ekkor volt sikeres a befújás.

Utószó

🐾 Remélem sok hasznos újdonságot sikerült átadnom Neked, kívánom, hogy ne legyen szükség vészhelyzetben cselekedned, de mostmár biztos lehetsz benne, hogy tudni fogod mit kell tenned!

Ha gyakorlatban is szeretnéd elsajátítani a sebkötözést, Heimlich manővert, újraélesztést, és egyéb életmentő fortélyokat, illetve személyesen feltenni kérdéseidet, akkor szeretettel várlak a következő elsősegély tanfolyamon, melyről itt találsz infókat: www.petwisecare.com

🐾 **EBOOK15** kóddal **15% kedvezményt is kapsz minden képzésünkre!**

A állatorvosi chatünkben pedig az első hónapból 25% kedvezményt kapsz az
🐾 **EBOOK25** kuponkóddal! **Katt: <https://petwisecare.com/online-allatorvos/>**

Remélem hamarosan személyesen is találkozunk, addig is csatlakozz gazdi közösségünkbe [facebook csoportunkban](#), és kövess be minket:

🐾 [Instán](#)

🐾 [TikTokon](#)

🐾 [Facebookon](#)



Ha állatorvosi kérdéseidet videochaten szeretnéd velem megbeszélni, az alábbi linken tudsz hozzám időpontot foglalni:

Sok boldog percet kívánok kedvenceddel!

Kutyabaráti üdvözlettel,
Dr. Piller Pálma





WWW.PETWISECARE.COM

