

## Otthoni nyuszipatika

Mivel a nyuszik rendkívül érzékeny állatok, és ráadásul tünetrejtők (ami azt jelenti, hogy csak akkor mutatják, hogy nincsenek jól, ha már nagy a baj), bármilyen probléma esetén az idő kritikus faktor, a lehető legrövidebb időn belül lehetőleg egzotikus állatokra, nyulakra specializálódott szakállatorvoshoz kell juttatni a nyuszit.

Könnyen előfordulhat azonban, hogy ünnepezen, vagy hétvégén lesz nyuszing rosszul, amikor nagyon nehéz állatorvost elérni. Ilyen esetekre érdemes otthon felszerelkedni az alap gyógyszerekkel, készítményekkel, hogy amíg eljuttatjuk állatorvoshoz a nyuszingat, addig is tudjunk számukra alapellátást nyújtani, és a tüneteket tompítani, az ő esetükben ez sokszor életmentő is lehet.

### **Fontos!**

**Az otthoni ellátás nem helyettesíti a szakszerű állatorvosi kezelést, amint lehetőségünk adódik, vigyük a nyuszit szakállatorvoshoz!**





## Otthoni nyuszipatika



- Meloxidyl 1,5mg/ml szuszpenzió (fájdalom és gyulladáscsökkentő) - adagolása 0,4 ml/ testtömegkg (ha esetleg “macsás” van otthon - 0,5mg/ml hatáserősségű, akkor abból 1,2ml/ttkg)
- Espumisan cseppek 100mg/ml (pocakgondokra, puffadásra, kemény pocak esetén) - 10-12 csepp/ttkg (ha esetleg a 40mg/ml hatáserősségű van otthon, abból 20-25 csepp/ttkg az általános adag)
- Bio-Lapis por (nyulas probiotikum): naponta 1 tasak, több részletre elosztva, tömény oldatként (1 ml vízben feloldva egy alkalommal)
- RodiCare akut (pocakgond esetén, emésztést és gyomortartalom oldását segíti) - 0,4ml/ttkg adható
- Táp a kényszeretetéshez (Trovet Recovery vagy Oxbow critical care a legpraktikusabbak, mert ezek már eleve por formában vannak, nem kell porrá zúzni)
- Fecskendők (1 és 2 milisek)
- Ferdocat (idegrendszeri tünetek megjelenése esetén)
- Vedlés idején szőroldópaszta (Natúr GimCat vagy Gimbi)

## Fontos!

Amennyiben van lehetőség orvosi ellátásra, akkor a Meloxidyl beadása után, ha nincs javulás 1-2 órán belül, mindenképp vigyük a nyusztit orvoshoz. Az evés és bogyózás elmaradása rendkívül súlyos háttérbetegséget is jelenthet, ezért ebben az esetben mihamarabb szakorvoshoz kell juttatni a nyusztit. Például ilyen tipikusan a vedlő nyusztiknál a bélelzáródás esete is - amely 8 óra alatt egy teljesen tünetmentes nyusztihaláláshoz vezethet!

